



Switch 62,5 WG [1 L]

Switch 62,5 WG jest środkiem grzybobójczym, docenianym przez wielu producentów jak i osób uprawiających amatorsko rośliny warzywne, owocowe, zielarskie i ozdobne. Wykazuje działanie zapobiegawcze...

Switch 62,5 WG jest środkiem grzybobójczym, docenianym przez wielu producentów jak i osób uprawiających amatorsko rośliny warzywne, owocowe, zielarskie i ozdobne. Wykazuje działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne, polegające na hamowaniu wzrostu grzybní, skutecznie zwalczając takie choroby jak szara pleśń, alternarioza, zgnilizna twardzikowa, zgorzelowa plamistość czy antraknoza. Stosowanie preparatu Switch 62,5 WG w okresie przedzbiorczym pozytywnie wpływa na trwałość zbiorów, co ma szczególne znaczenie w przypadku warzyw, jak również owoców jagodowych.

W przypadku stosowania środka ochrony roślin Switch 62,5 WG w opakowaniu 1 L (PRE-RTU) należy mocnym ruchem wyciągnąć kolorowy plastikowy pierścień znajdujący się wokół szyjki butelki, a następnie mocno przykręcić końcówkę ze spryskiwaczem do butelki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pozwala to na uwolnienie koncentratu bezpośrednio do butelki bez kontaktu ze środkiem. Następnie silnie wstrząsnąć butelką. Przygotowana mieszanina jest wystarczająca do opryskania uprawy o powierzchni od kilkunastu do kilkudziesięciu m² i należy ją zużyć w ciągu 24 godzin.

Wybrane zastosowanie preparatu Switch 62,5 WG:

Uprawa	Stosowanie	Choroba
truskawka	Opryski wykonywać w odstępach co 10 - 14 dni, maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym. Podczas wykonywania oprysku należy dokładnie pokryć rośliny cieczą.	szara pleśń, antraknoza
malina	Opryski wykonywać w odstępach co 10 dni, maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym. Podczas wykonywania oprysku należy dokładnie pokryć rośliny cieczą.	antraknoza, szara pleśń, zamieranie pędów malin
fasola szparagowa	Opryski wykonywać w odstępach co 10 - 14 dni, maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym. Podczas wykonywania oprysku należy dokładnie pokryć rośliny cieczą.	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli
rośliny ozdobne	Opryski wykonywać w odstępach co 10 - 14 dni, maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym. Podczas wykonywania oprysku należy dokładnie pokryć rośliny cieczą.	szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów, zamieranie pędów i kwiatów powodowanych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych

Zawartość substancji czynnej: cyprodynil (związek z grupy anilinopirymidyn) - 375 g/kg środka (37,5 %), fludioksonil (związek z

grupy fenylopiroli) – 250 g/kg środka (25 %)

Rejestracja: Produkt do stosowania zarówno przez użytkowników amatorskich jak i profesjonalnych

Zalecany termin stosowania: kwiecień – październik