



## Miedzian Extra 350 SC Agropak [25 ML] - Skuteczna walka z parchem jabłoni i gruszy

Miedzian® Extra 350 SC to popularny środek grzybobójczy i bakteriobójczy do ochrony drzew owocowych (jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie) przed parchem, zarazą ogniową i rakiem bakteryjnym. Zawiera 350g/L miedzi w formie tlenochloru, dostępny jako stężona zawiesina do rozcieńczania. Działa powierzchniowo, zapewniając skuteczną ochronę. Certyfikowany do upraw ekologicznych.

**Miedzian® Extra 350 SC** to jeden z najbardziej popularnych środków ochrony roślin o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym. Skutecznie **chroni drzewa owocowe**: jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie przed **parchem, zarazą ogniową czy rakiem bakteryjnym drzew pestkowych**. Zawiera 350 g/L miedzi w postaci tlenochloru miedzi. Produkt ma postać stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Po naniesieniu na roślinę (oprysku) **działa powierzchniowo stanowiąc skuteczną barierę ochronną**. Miedzian Extra 350 SC można stosować przez **cały okres wegetacji**, poza okresami intensywnej aktywności pszczoł (kwitnienie). Jest **certyfikowany do stosowania w uprawach ekologicznych**.

### Główne korzyści stosowania produktu Miedzian® Extra 350 SC

- **Ochrona** - Działa zapobiegawczo tworząc na roślinie barierę ochronną.
- **Skuteczność** - Zapobiega chorobom grzybowym i bakteryjnym takim jak: parch jabłoni i parch gruszy, zaraza ogniowa, rak bakteryjny drzew pestkowych.
- **Bezpieczeństwo stosowania** - Decyzją Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytut Badawczy w Poznaniu, został zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
- **Wygodna forma** - Stężona zawiesina łatwo rozpuszczalna w wodzie.
- **Niezawodność** - Ogranicza ryzyko powstania odpornych patogenów,.

### Jak stosować Miedzian® Extra 350 SC

- **Dawkowanie**: 7,5 ml - 30 ml środka w 5 L - 7,5 L wody / 100 m<sup>2</sup> (w zależności od uprawy i fazy rozwojowej rośliny) - tabela poniżej.
- **Częstotliwość**: 1 - 2 zabiegi w odstępie 7 dni (w zależności od konkretnej uprawy oraz zwalczanej choroby).
- **Zalecany termin stosowania**: luty - listopad
- **Sposób użycia**: Rośliny opryskiwać punktowo w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone ale nie tworzyły się na nich krople; przy użyciu opryskiwaczy ręcznych o pojemności do 10 L, z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem elektrycznym i spalinowym.

## Miedzian® Extra 350 SC - zwalczane choroby i uprawy, w których można zastosować środek

- **Choroby:** parch jabłoni, parch gruszy, zaraza ogniowa, rak bakteryjny drzew pestkowych
- **Uprawy:** jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia

## Cechy produktu Miedzian® Extra 350 SC

- **Składnik aktywny:** miedź w postaci tlenochlorku miedzi 350 g/L
- **Forma:** Stężona zawiesina (koncentrat) do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem.
- **Użytkownik:** Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
- **Zgodność z ekologicznymi standardami:** Certyfikowany do stosowania w uprawach ekologicznych.

## Wybrane zastosowanie preparatu Miedzian® Extra 350 SC:

| Uprawa            | Zalecana dawka                                                                                                                                                      | Choroba                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| jabłoń            | w fazie rozwoju pąka: 15 ml w 5 L - 7,5 L wody / 100 m <sup>2</sup>                                                                                                 | parch jabłoni                   |
| grusza            | w fazie rozwoju pąka: 15 ml w 5 L - 7,5 L wody / 100 m <sup>2</sup>                                                                                                 | parch gruszy                    |
| grusza            | faza kwitnienia: 15 ml w 5 L - 7,5 L wody / 100 m <sup>2</sup><br>faza wzrostu owoców: 7,5 ml w 5 L - 7,5 L wody / 100 m <sup>2</sup>                               | zaraza ogniowa                  |
| wiśnia, czereśnia | w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych: 30 ml w 5 L - 7,5 L wody / 100 m <sup>2</sup><br>na początku fazy kwitnienia: 15 ml w 5 L - 7,5 L wody / 100 m <sup>2</sup> | rak bakteryjny drzew pestkowych |