



Amistar® 250 SC Pre-Rtu Agropak [1 L] Spray - Skuteczny środek grzybobójczy do warzyw

Amistar® 250 SC Pre-Rtu to skuteczny środek grzybobójczy do warzyw, chroniący przed chorobami grzybowymi, takimi jak szara pleśń, mączniak, alternarioza, czerń krzyżowa czy zgnilizna twardzikowa. Zawiera azoksystrobinę, która działa systemicznie – chroni całą roślinę, nawet nieopryskane części.

Amistar® 250 SC Pre-Rtu to środek **grzybobójczy do warzyw**, który chroni przed chorobami grzybowymi, takimi jak szara pleśń, alternarioza, mączniak prawdziwy i rzekomy, czerń krzyżowa, zgnilizna Twardzikowa czy rdza. Środek działa „od środka” – to znaczy, że po oprysku składnik aktywny (azoksystrobina) wnika do rośliny i rozchodzi się wraz z sokami, docierając nawet do tych części, które nie zostały bezpośrednio spryskane. Idealny do stosowania w przydomowym ogrodzie, tunelu foliowym czy na działce.

Uwaga! Środek w butelce z atomizerem do bezpośredniego użycia po aktywacji.

Należy mocnym ruchem wyciągnąć kolorowy plastikowy pierścień znajdujący się wokół szyjki butelki, a następnie mocno przykręcić końcówkę ze spryskiwaczem do butelki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pozwala to na uwolnienie koncentratu bezpośrednio do butelki bez kontaktu ze środkiem. Następnie silnie wstrząsnąć butelką. Przygotowana mieszanina jest wystarczająca do opryskania uprawy o powierzchni od kilkunastu do kilkudziesięciu m² i należy ją zużyć w ciągu 24 godzin.

Główne korzyści stosowania produktu Amistar® 250 SC Pre-Rtu

- **Wszechstronność:** Zwalcza szerokie spektrum chorób grzybowych roślin uprawnych.
- **Skuteczność:** Działa włącznie i systemicznie dzięki czemu dociera do każdej części rośliny (również nie opryskanej).
- **Wygodna forma:** Środek w butelce z atomizerem do bezpośredniego użycia po aktywacji.
- **Niezawodność:** Chroni przed wtórną infekcją. Odporny na zmywanie przez deszcz.

Jak stosować Amistar® 250 SC Pre-Rtu

- **Dawkowanie:** Opryskać rośliny zgodnie z tabelą w zależności od uprawy i fazy rozwojowej rośliny.
- **Częstotliwość:** 2-3 zabiegi w odstępie 7-14 dni w zależności od konkretnej uprawy oraz zwalczanej choroby.
- **Zalecany termin stosowania:** Kwiecień – październik.
- **Sposób użycia:** Rośliny opryskiwać w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone ale nie tworzyły się na nich krople.

Amistar® 250 SC Pre-Rtu - zwalczane choroby i uprawy, w których można zastosować środek

- **Choroby:** Szara pleśń, alternarioza, mączniak prawdziwy i rzekomy, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, zgorzelowa plamistość, septorioza, rizoktonioza, fytoftoroza.

- **Uprawy:** Ziemniak, cebula, czosnek, szalotka, fasola szparagowa, groch, pomidor, por, seler, papryka, kapusta głowiasta, pekińska, kalafior, marchew, sałata.

Cechy produktu Amistar® 250 SC Pre-Rtu

- **Składnik aktywny:** Azoksystroina (związek z grupy strobiluryn) 250 g/L (22,81%).
- **Forma:** Stężona zawiesina (koncentrat) do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem.
- **Użytkownik:** Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych (w tym w uprawach małoobszarowych).

Wybrane zastosowanie preparatu Amistar® 250 SC Pre-Rtu

Uprawa	Stosowanie	Choroba
pomidor (w polu)	opryski wykonywać od fazy początku rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion	alternarioza pomidora, mączniak prawdziwy pomidora
marchew	opryski wykonywać od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru	mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi
cebula, czosnek, szalotka	opryski wykonywać od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń
por	opryski wykonywać od fazy 6 liścia do końca fazy wzrostu pora	rdza pora, alternarioza pora, <i>Fytoftoroza</i> , plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vericarium</i> oraz <i>Cladosporium alliicepa</i>
seler korzeniowy	opryski wykonywać od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru	septorioza selera
fasola szparagowa	opryski wykonywać od początku fazy kwitnienia do fazy rozwoju strąków	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
groch	opryski wykonywać od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia	askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior	opryski wykonywać od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru	czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych
sałata (w polu)	opryski wykonywać od fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru	mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, rizoktonioza
sałata (pod osłonami)	opryski wykonywać od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza
papryka (szklarnie)	opryski wykonywać od fazy 6 liścia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki