



Spintor 240 SC Agropak [50 ML] - Środek owadobójczy na stonkę, wciornastki

SpinTor® 240 SC to skuteczny środek owadobójczy do zwalczania szkodników gryzących w uprawach warzyw, krzewów i drzew owocowych. Działa kontaktowo, żołądkowo i wgłębnie, powodując paraliż i śmierć owadów już w kilka godzin. Zawiera 240 g/L spinosadu – substancji biologicznego pochodzenia naturalnego. Produkt w formie koncentratu, dopuszczony do upraw ekologicznych. Szybkie i skuteczne działanie dla zdrowych pól!

SpinTor® 240 SC środek **owadobójczy** przeznaczony do zwalczania **szkodników gryzących** w **uprawach roślin warzywnych** (między innymi: ziemniak, kapusta, kalafior, pomidor, ogórek, cebula), **krzewów** (borówka porzeczka, truskawka, malina) i **drzew owocowych** (grusza). Zwalcza szkodniki na trzy sposoby: **kontaktowo, żołądkowo i wgłębnie**. Produkt w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, zawiera 240 g/L spinosadu otrzymywanego w wyniku fermentacji bakterii *Saccharopolyspora spinosa*. Substancja biologicznie czynna działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie śmierci szkodników. **Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu**, śmierć szkodnika następuje po upływie kilku godzin. Środek jest zarejestrowany **do stosowania w uprawach ekologicznych**.

Główne korzyści stosowania produktu SpinTor® 240 SC:

- **Skuteczność** - Potrójne działanie: kontaktowe, żołądkowe oraz jajobójcze. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
- **Szybkość działania** - Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć szkodnika następuje po upływie kilku godzin.
- **Bezpieczeństwo** - Selektywny dla owadów pożytecznych, zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Jak stosować SpinTor® 240 SC:

- **Dawkowanie:** 1 ml - 4 ml środka w 2 L - 12 L wody / 100 m² lub 0,04% (w zależności od uprawy i szkodnika)
- **Częstotliwość:** 1 - 4 zabiegów w odstępie 7 - 14 dni (w zależności od konkretnej uprawy oraz zwalczanej choroby)
- **Zalecany termin stosowania:** marzec - wrzesień.
- **Sposób użycia:** Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 8° do 25°C.

SpinTor® 240 SC - zwalczane szkodniki oraz uprawy w których można zastosować środek:

- **Szkodniki:** larwy stonki ziemniaczanej, bielek kapustnik, bielek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, wciornastek różówek, muszka plamoskrzydła (*Drosophila suzukii*), zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, liściolubka selerowa, śmietka ćwiklanka, skośnik pomidorowy, zwójka siatkóweczka, pędzik przedzimek

- **Uprawy:** ziemniak, pomidor, ogórek, bakłażan, papryka, kapusta głowiasta, sałata, rukola, roszponka, szpinak, szczypiorek, kalafior, brokuł, cebula, czosnek, por, seler korzeniowy i naciowy, jarmuż, kalarepa, borówka wysoka, porzeczka biała, czerwona i czarna, żurawina, truskawka, malina, jeżyna, grusza

Cechy produktu SpinTor® 240 SC:

- **Składnik aktywny:** Spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D (substancja z grupy spinozyn) - 240 g/l (22,72 %)
- **Forma:** Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej
- **Użytkownik:** Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Wybrane zastosowanie preparatu Spintor 240 SC:

Uprawa	Zalecana dawka	Szkodnik
borówka wysoka, agrest, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, żurawina, truskawka, malina, jeżyna	3,2 ml - 4 ml środka w 2 L - 12 L wody / 100 m ²	muszka płomskrzydła, wciornastek różówek, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka
grusza	6 ml środka w 2 L - 6 L wody / 100 m ²	zwójka siatkóweczka, piędzik przedzimek
ziemniak	1 ml - 1,5 ml środka w 1,5 L - 4 L wody / 100 m ²	larwy stonki ziemniaczanej
pomidor, ogórek (pod osłonami)	2 ml środka w 5 L wody / 100 m ²	wciornastek zachodni
bakłażan, papryka, pomidor (pod osłonami)	2 ml - 4 ml środka w 2 L - 6 L wody / 100 m ²	skośnik pomidorowy, wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna
sałata	4 ml środka w 2 L - 6 L wody / 100 m ²	wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka,
kapusta głowiasta biała	2 ml - 4 ml środka w 2 L - 6 L wody / 100 m ²	bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
kalafior, brokół	2 ml - 4 ml środka w 2 L - 6 L wody / 100 m ²	bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
cebula, por	3 ml - 4 ml środka w 2 L - 6 L wody / 100 m ²	wciornastek tytoniowiec
seler	4 ml środka w 2 - 6 L wody / 100 m ²	liściolubka selerowa